



بیمارستان آیت الله مدنی بجنستان
واحد آزمایشگاه

آمادگی و نکات مهم قبل از انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع

گاهی خونریزی‌های خفیف در بخش‌های مختلف دستگاه گوارش رخ می‌دهد که به دلیل کم بودن مقدار خون، با چشم دیده نمی‌شود. بنابراین این موارد باید با روش‌های آزمایشگاهی شناسایی شوند. بهتر است این آزمایش در ۳ نوبت انجام شود.

برای انجام این آزمایش، رعایت نکات زیر ضروری است:

- ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از آزمایش و در طول دوره جمع‌آوری نمونه، از مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، شلغم و تربچه خودداری کنید.
- مصرف داروهایی مانند قرص‌های آهن و فر فولیک، کپسول همتاینیک و ففول، ایندومتاسین، گلشی‌سین، آسپرین، بروفن، کورتون‌ها و ویتامین C باید ۴۸ ساعت قبل از آزمایش قطع شود.
- در صورت داشتن سابقه خونریزی لثه، ۴۸ ساعت قبل از آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان خودداری نمایید.
- نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحویل داده شود.
- دقت کنید نمونه مدفوع با ادرار یا سایر مواد آلوده نشود.