

فشار خون بارداری

تشخیص فشار خون بارداری زمانی است که فشار خون به ۱۴۰ میلی لیتر جیوه یا بیشتر برسد در صورتی که در آزمایش ادرار، دفع پروتئین وجود داشته باشد تحت عنوان مسمومیت بارداری شناخته می شود در صورتی که افزایش فشار خون با تورم یا ادم دست و پا یا صورت وجود پروتئین در ادرار همراه باشد، به آن پره اکلامپسی یا مسمومیت حاملگی گفته می شود که در سه ماه آخر باداری بیشتر شایع میشود چنانچه این وضعیت درمان نشود پیشرفت علائم به پره اکلامپسی منجر می شود که با تشنج، همراه بوده و عوارض بسیار شدیدی روی جنین و مادر دارد و گاهاً منجر به مرگ مادر و جنین یا هر دو می شود.



علت :

- علت ناشناخته است و فرضیه های مختلفی برای توجیه آن ارائه شده است:
- ❖ عدم تحمل بین بافت‌های مادر، جفت و جنین
 - ❖ تطابق نادرست مادر با تغییرات قلبی، عروقی
 - ❖ کمبودهای تغذیه‌ای
 - ❖ مسائل ژنتیکی و بیماریهای زمینه‌ای

Blood Pressure



عارض جنینی شامل:

- ❖ زایمان زودرس
- ❖ جدا شدن زودرس جفت
- ❖ زجر جنین
- ❖ مرگ داخل رحمی
- ❖ کاهش رشد





بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

فشار خون بارداری و آموزش به بیمار



واحد آموزش به بیمار
بهار 1403
کد دستنامه: PE-PA-73
بازنگری 3

مادر آگاه، بارداری سالم، نوزاد سالم



آموزش به بیمار:

- ❖ در زمان استراحت در بستر به پهلوی چپ بخوابید.
- ❖ اندازه گیری مرتب فشارخون در وضعیت نشسته توژین (وزن کردن) روزانه رژیم غذایی کم نمک
- ❖ اندازه گیری پروتئین دفعی از ادرار بررسی آزمایشات خونی
- ❖ بررسی جنین از طریق سونوگرافی و کنترل صدای قلب جنین
- ❖ استفاده مرتب از داروهای تجویز شده توسط پزشک
- ❖ مراجعه به موقع به پزشک معالج

